

Опасная болезнь - ДИФТЕРИЯ

Важность дифтерийной инфекции заключается в постоянной циркуляции штаммов в окружающей среде. В 90 годы зафиксированная эпидемия в России унесла много жизней. В настоящее время регистрируются только единичные случаи, но бдительность в отношении этой инфекции не должна быть утрачена. Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями дифтерии, способными вырабатывать токсин. Заболевание характеризуется воспалением слизистых оболочек ротоглотки, носоглотки, явлениями интоксикации, поражением сердечно-сосудистой, нервной и выделительной систем

Источником инфекции является больной человек и носитель токсигенной дифтерийной палочки. Передача возбудителя происходит воздушно-капельным путем и контактно-бытовым, через загрязненные поверхности, игрушки, предметы ухода. Время от контакта с больным или бактериовыделителем до появления первых симптомов заболевания проходит от 2 до 10 дней.

Признаки дифтерии зависят от места локализации возбудителя: ротоглотка, носоглотка, трахея, бронхи, глаза.

Общие симптомы, характерные для всех форм болезни – это слабовыраженная боль в горле, осиплость голоса, затрудненное дыхание, температура. Чаще встречается дифтерия ротоглотки, и проявляется отеком и наличием трудноотделяемого налета, бело-серого цвета пленки на миндалинах, эти налеты могут выходить за пределы миндалин, на мягкое небо, трахею, бронхи. Дифтерийный круп – самая опасная форма дифтерии, которая может привести к удушью и смерти из-за закупорки дыхательных путей пленками.

Лечение дифтерии на ранних стадиях обеспечивает полное выздоровление без осложнений и со стороны сердца (миокардит), и со стороны нервной системы (параличи). Независимо от тяжести течения болезни, как у детей, так и у взрослых, лечение должно проводиться в условиях стационара. Госпитализация обязательна и для больных с подозрением на дифтерию.

Наиболее эффективная профилактика дифтерии – это вакцинация. Вакцинация против дифтерии входит в Национальный календарь профилактических прививок, проводят детям в возрасте 3, 4, 5 и 6 месяцев и ревакцинацию в 18 месяцев, 6-7 и 14 лет. После этого ревакцинация взрослым проводится каждые 10 лет.

Помните об опасности дифтерии!

Берегите свое здоровье и здоровье своих детей.

*Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей
управления здравоохранения Липецкой области
Беляева Татьяна Ивановна*